

CONSORT-EHEALTH، بهبود و استانداردسازی گزارش‌های

ارزشیابی مداخلات سلامت مبتنی بر وب و تلفن همراه

متوجهان و ویراستاران (به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی): علیرضا احمدوند^۱، مليکا حنیفی‌ها^۲، علی گنجی‌زاده^۳

مجید مختارنیا^۴، پوریا مقصودی دربه

۱- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲- دانشکده پزشکی و دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳- شرکت ایده پردازان وزین سلامت نوین (اوین) ۴- شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) ۵- دانشگاه علوم پزشکی تهران

* نویسنده مسؤول: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی. تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۸۹۱۲۷ نمبر: ۰۲۱-۸۸۹۸۹۱۲۷ پست الکترونیک: ahmadvand.ar@gmail.com

دریافت: ۹۴/۲/۲۷ پذیرش: ۹۴/۵/۲۵

چکیده

مقدمه: مداخلات سلامت مبتنی بر وب و تلفن همراه (که «مداخله‌های اینترنتی» یا «مداخله‌های eHealth/mHealth» نیز نامیده می‌شوند) ابزارها یا درمان‌هایی عمدتاً مبتنی بر تغییر رفتار هستند که برای ارایه از طریق اینترنت و یا تلفن همراه، طراحی و عملیاتی شده‌اند. این مداخله‌ها شامل ابزارهای الکترونیکی برای بیماران، مرافقان آن‌ها، افراد سالم و هم‌چنین ارایه‌دهندگان خدمات سلامت می‌شوند. بیانیه کانسورت (CONSORT) به منظور ارتقای کیفیت گزارش‌دهی کارآزمایی‌های تصادفی شده شاهددار (RCTs) تدوین گردید. در عین حال که بیانیه کانسورت را می‌توان به عنوان بهترین راهنمایی عالم برای گزارش‌دهی کارآزمایی‌های eHealth و mHealth مورد استفاده قرار داد، RCT‌های مبتنی بر وب، مسایل و چالش‌های بسیار خاصی دارند که اختصاصاً ناشی از جزئیات مداخله هستند که تکرار پذیری و شکل‌گیری فرضیه را ممکن سازند. هدف از این مطالعه، بسط چک‌لیست کانسورت و نام‌گذاری آن به کانسورت سلامت الکترونیک (CONSORT-EHEALTH) به معنی «استانداردهای تلفیقی گزارش‌دهی کارآزمایی‌های سلامت با استفاده از برنامه‌های کاربردی (اپلیکیشن‌های) الکترونیک و نرم‌افزارهای تلفن همراه و سلامت از راه دور آنلاین (Tele Health) بود» تا به این وسیله، ضمیمه‌ای از بیانیه اصلی کانسورت به عنوان راهنمایی برای نویسنده‌گان مداخلات eHealth و mHealth فراهم شود.

روش کار: روش کار شامل بررسی متون علمی و به دنبال آن بررسی پیمایشی بین صاحب‌نظران eHealth و برگزاری یک کارگاه آموزشی بود.

یافته‌ها: چک‌لیستی به عنوان ضمیمه‌ای برای بیانیه کانسورت تهیه شد. این ابزار توسط «مجله تحقیقات اینترنت پزشکی» (JMIR) مورد استفاده قرار گرفته است و نویسنده‌گان RCT‌های eHealth، در زمان ارسال مقاله به JMIR ملزم به ارسال یک نسخه الکترونیکی از این چک‌لیست جدید هستند تا توضیح دهنده چگونه هر یک از زیرعنوان‌های آن را پوشش داده‌اند. **نتیجه گیری: راهنمای CONSORT-EHEALTH** این قابلیت بالقوه را داراست که ضمن بهبود گزارش‌دهی، مبنای برای ارزیابی اعتبار و قابلیت اجرای کارآزمایی‌های eHealth فراهم آورد. زیرعنوان‌هایی که چگونگی گزارش‌دهی این مداخلات را تشریح می‌کنند، می‌توانند برای گزارش‌دهی ارزیابی‌های سایر مطالعات (غیر از RCTs) نیز مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان بخشی از فرایند توسعه و گسترش این راهنمای، گنجاندن یک جزء ارزشیابی، ضروری است. بنابراین، از نویسنده‌گان RCT‌ها بازخورد دریافت خواهد شد و یک مطالعه با طراحی قبل و بعد نیز انجام خواهد گرفت تا مشخص شود آیا با تدوین این چک‌لیست، گزارش‌دهی بهبود یافته است یا خیر.

گل واژگان: ارزشیابی، اینترنت، سلامت همراه، استانداردهای گزارش‌دهی، استانداردهای انتشار، راهنمایها، کنترل کیفیت، کارآزمایی‌های تصادفی شده شاهددار، انفورماتیک پزشکی

محله تحقیقات نظام سلامت حکیم

مقدمه

افزایش اهمیت روزافزون آن هستیم، درمان بیماری‌های مزمن مانند کنترل و درمان دیابت با استفاده از برنامه‌های مبتنی بر اینترنت یا تلفن همراه، پرونده‌های سلامت فردی با قابلیت دسترسی برای بیماران، و همچنین، برنامه‌های آموزشی اختصاصی یا سفارشی برای بیماران است. اصطلاح «درمان» را باید در وسیع ترین معنای ممکن آن در نظر گرفت که به عنوان نمونه، می‌تواند شامل موارد زیر باشد: ابزارهای درمان، ابزارهای الکترونیکی که می‌توانند ارتباطات بین‌فردی را بهبود بخشد (مثلًاً بین بیماران و کارکنان نظام سلامت) و یا سامانه‌هایی که اطلاعات تشخیصی یا پیش‌آگهی در زمینه بیماری ارایه می‌دهند و یا در تراپیا بیماران کمک می‌کنند.

مدخلات مبتنی بر وب یا تلفن همراه، ابزارهایی هستند که اهمیت آنها در نظر مختصان سلامت همگانی و نیز پژوهشگران، در حال افزایش است (1-3). ارایه خدمات مبتنی بر وب، سبب می‌شود تا نامنوبیسی، جذب و رهگیری تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان در مطالعات طولی، از جمله RCT‌ها، برای آزمودن اثربخشی اجزای یک برنامه یا مداخله خاص، یا سنجش اثربخشی کل یک برنامه، به مراتب آسان‌تر شود. اگرچه، سهولت در نامنوبیسی، جذب و رهگیری، آن چنان که تصور می‌شود بی‌عارضه نیست. در مقایسه با کارآزمایی‌های eHealth، کنترل و نظارت کمتری بر شرکت‌کنندگان دارند و کارآزمایی‌های مبتنی بر اینترنت، مشکلات اختصاصی خاص خودشان را در زمینه اجرا و گزارش دهنده دارند (4). هر چند که این عرصه، هنوز نوپاست و تا قبل از سال 2002، تعداد اندکی RCT مبتنی بر وب منتشر شده است (4 و 5)، تعداد گزارش‌های ارزشیابی مدخلات مبتنی بر وب در متون علمی پژوهشی به سرعت در حال افزایش است. در مرور اجمالی عنوانین مقالات نمایه شده در PubMed از نوع «کارآزمایی با تخصیص تصادفی» و با کلمه کلیدی «Internet» (مستخرج از MeSH³) (اکتبر 2010)، تعداد 582 کارآزمایی تصادفی شده یافت شد. البته لازم به ذکر است که این تعداد، ارزشیابی کاربردهای شبکه‌ای تلفن همراه (که ممکن است با کلمه کلیدی «Internet» نمایه نشوند)، یا مطالعات طولی با طراحی‌های غیرتصادفی را شامل نمی‌شد.

علاوه بر رشد سریع عرصه مدخلات اینترنتی، RCT‌هایی که مدخلات اینترنتی ندارند نیز از اجزای مبتنی بر وب (به عنوان

معرفی CONSORT-EHEALTH: شماره ماه آوریل سال 2011 «مجله تحقیقات اینترنت پزشکی» (JMIR)¹ اولین شماره‌ای از JMIR بود که از نویسنده‌گان خواست تا کارآزمایی‌های تصادفی شده شاهدDar (RCTs)² را ارسالی خود را با استفاده از ابزاری جدید تشریح کنند؛ ابزاری که طراحی شده بود تا کیفیت گزارش دهنی کارآزمایی‌های مداخلات سلامت الکترونیک (eHealth) و سلامت همراه (mHealth) را بهبود بخشد. این ابزار به اختصار با نام کانسورت سلامت الکترونیک (CONSORT-EHEALTH) به عنوان «استانداردهای تلفیقی گزارش دهنی کارآزمایی‌های سلامت با استفاده از برنامه‌های کاربردی (پلیکشن های) الکترونیک و نرم‌افزارهای همراه؛ و سلامت از راه دور آنلاین (Tele Health)» شناخته می‌شود. هر چند که تکمیل چکلیست کانسورت، شرطی است که برای نویسنده‌گان کارآزمایی‌های بالینی در نظر گرفته می‌شود، اما این چکلیست می‌تواند برای پژوهشگرانی که از سایر روش‌های ارزیابی نیز استفاده می‌کنند، مفید باشد. فراتر از مدخلات مبتنی بر وب و تلفن همراه، چکلیست ارایه شده در این مقاله، این قابلیت را دارد که در طیف گسترده‌تری از برنامه‌های کاربردی انفورماتیک پزشکی و فن‌آوری مورد استفاده قرار گیرد. مقاله حاضر، مقدمه‌ای کوتاه در مورد دلایل منطقی و زمینه‌های فکری انجام این تلاش دراز مدت است که با هدف بهبود کیفیت پژوهش و ترجمان دانش در این زمینه انجام شده است.

مدخلات سلامتی مبتنی بر وب و تلفن همراه: در این مقاله، مداخله‌های سلامت مبتنی بر وب (که «مددخله‌های اینترنتی» یا «مددخله‌های eHealth» نیز نامیده می‌شوند)، ابزارها یا درمان‌هایی عمده‌ای مبتنی بر تغییر رفتار هستند که برای ارایه از طریق اینترنت و یا تلفن همراه، طراحی و عملیاتی شده‌اند (1). با توجه به گسترش استفاده از تلفن‌های همراه به عنوان روش‌های دسترسی به افراد برای مدخلات مبتنی بر وب، و یا سایر شبکه‌های الکترونیکی موجود، تعریف ذکر شده شامل مداخلاتی می‌شود که از طریق تلفن‌های همراه یا نسل جدید تبلت- کامپیوترها (مانند آی‌پد) ارایه می‌شوند. مداخلات ترک سیگار یا کاهش وزن از طریق تغییر رفتار، یا برنامه‌های کاربردی سلامت روان برای کنترل افسردگی، اضطراب و یا سایر مسائل سلامت، نمونه‌هایی از این مداخلات هستند. عرصه دیگری که شاهد

¹ JMIR: Journal of Medical Internet Research

² RCT: Randomized Controlled Trials

هم‌اندیشی و اجماع، آغاز شد. متأسفانه، این درخواست بودجه رد شد و توضیحاتی عجیب مانند این که «(معلوم نیست) چرا سردبیران مجله (بخش خصوصی) برای تکمیل این پروژه نیازمند بودجه هستند؟» ارایه گردید. برنامه‌ریزی اولیه شامل فرایندی سه‌مرحله‌ای بود: تدوین عنوان‌پیش از جلسه، برگزاری جلسه‌ای با ذی‌نفعان دعوت شده و در نهایت، ترکیب و جمع‌بندی عنوان‌پیش از جلسه. بدون دریافت بودجه، این برنامه‌ریزی اولیه دچار تغییراتی شد به طوری که تنها یک کارگاه چهره‌به چهره بسیار کوتاه در خلال یک جلسه علمی برگزار شد و بخش عمده فعالیت‌های بعدی، از طریق مشاوره‌های آنلاین صورت گرفت.

CONSORT-EHEALTH گروه اصلی بین‌المللی همکاران شامل پژوهشگران، تأمین‌کنندگان مالی، مصرف‌کنندگان، سردبیران مجلات و صنایع بودند. این گروه، یک گروه باز و پویا بوده و خواهد ماند. در فرایند تدوین عنوان‌پیش از جلسه، از دستورالعمل فعلی کانسورت به عنوان یک چارچوب استفاده شد و با استفاده از جستجوی متون علمی، استخراج عنوان‌پیش از جلسه انجام شد. دسترسی به نقدها و گزارش‌های داوران JMIR ارزیابی این کدام یک از عنوان‌پیش از جلسه انجام شد. در مقایسه با نظریه «missing» در مقالات اصیل ارسالی مطرح می‌شود، را تسهیل کرد. از طریق برگزاری جلسه چهره‌به چهره‌ای که توسط انجمن بین‌المللی پژوهش در مداخلات اینترنتی (ISRII)، در سیدنی استرالیا در تاریخ 6 تا 8 آوریل 2011 میزبانی شده بود، ایده‌ها و نظرات بیشتری به دست آمد.

CONSORT-EHEALTH نسخه اولیه (V1.5) چک لیست در آوریل 2010 منتشر شد. در یک فرایند دلفی مبتنی بر وب، اطلاعاتی در مورد اهمیت عنوان‌پیش از جلسه در این نسخه کنندگان خواسته شد تا عنوان‌پیش از جلسه را (تحت هر یک از زیرعنوان‌های کانسورت) پیشنهاد و به هر زیرعنوان پیشنهادی، از 1 تا 5 امتیاز دهند (1 به معنی این که «زیرعنوان اصلًا مهم نیست» و 5 به معنی «ضروری بودن زیرعنوان» بود). عنوانی که حداقل 50% از پاسخ‌دهندگان به آن امتیاز 5-«ضروری» داده بودند، به عنوان «ضروری» در کانسورت eHealth حفظ شدند. هنگامی که حداقل 50% از پاسخ‌دهندگان به «ضروری» است، رتبه آن عنوان از ضروری، به «قویاً توصیه می‌شود» کاهش داده شد. اگر کمتر از 50% از پاسخ‌دهندگان به یک عنوان امتیاز 4 یا 5 داده بودند، آن عنوان حذف شد.

نمونه نانویسی و جذب از طریق وب، یا جمع‌آوری‌های داده در وب) بهره می‌برند (6). با این که JMIR از نظر شاخص تأثیرگذاری و تعداد مقالات منتشر شده، مجله‌ای پیشرو در این عرصه است، این کارآزمایی‌ها در طیف گسترده‌ای از مجلات پژوهشی، و منتشر شده‌اند. در مرور اجمالی صورت گرفته در اکتبر سال 2010، تعداد 263 مجله مختلف شناسایی شد که حداقل یک مقاله RCT مرتبط با «eHealth» منتشر کرده بودند؛ البته، بیشترین تعداد در JMIR منتشر شده بود. به دلیل همین پژوهشگری، استانداردهای گزارش دهی و میزان جزئیات ارایه شده در مقالات مجلات گوناگون، مانع بر سر راه پیشرفت در این عرصه است که ترجمان دانش این حوزه را به تأخیر می‌اندازد. اگرچه در JMIR از نویسندهای خواسته می‌شود که چکلیست کانسورت را همراه مقاله‌شان ارسال کنند (7-11) و یا از چکلیست‌های اضافی برای برخی از جنبه‌های این کارآزمایی‌ها استفاده کنند (به عنوان نمونه، چک لیست گزارش دهی تایپ نظرسنجی‌های الکترونیکی اینترنتی [CHERRIES]⁴)، تا این زمان راهنمای گزارش دهی توسعه یافته و پذیرفته شده‌ای در سطح بین‌المللی، اختصاصاً برای eHealth و mHealth ارایه نشده است.

بیانیه کانسورت برای بهبود گزارش دهی نامطلوب RCT‌ها تدوین و ارایه شد (9). هر چند که بیانیه کانسورت (9) و برخی از ضمیمه‌های منتشر شده آن (7، 8، 10 و 11) و هم‌چنین سایر راهنمایی‌های تدوین شده برای سایر انواع مطالعات، می‌تواند به عنوان راهکاری عمومی در خصوص نحوه گزارش این مطالعات مورد استفاده قرار گیرند. مداخلات مبتنی بر وب مسائل و چالش‌های بسیار خاصی دارند (4 و 13) که این مقاله قصد دارد آن‌ها را به صورت ادغام یافته و تفصیلی، و به صورت خاص در قالب یک ضمیمه راهنمای چکلیست کانسورت ترکیب و با نام CONSORT-EHEALTH ارایه کند.

روش کار

به منظور تدوین راهنمای گزارش دهی مداخله‌های مبتنی بر وب، به طور کلی از روش استاندارد طراحی شده توسط گروه کانسورت استفاده شد که جزئیات آن در جای دیگر ارایه شده است (14). کار بر روی کانسورت eHealth در اکتبر سال 2010 با نوشتن یک پروپوزال برای درخواست بودجه از مؤسسات تحقیقات سلامت کانادا (CIHR)، در قالب برگزاری کارگاه

⁴ CHERRIES: Checklist for Reporting Results of Internet E-Surveys

نتایج

این راهنمای نام COSORT-EHEALTH نسخه 1.6.1 (که در حال حاضر، توسط JMIR مورد استفاده قرار می‌گیرد) دارای 17 زیرعنوان «ضروری» و 35 زیرعنوان «قویباً توصیه شده» است. چکلیست این راهنمای (نسخه 1.6.1) در تاریخ 25 اوت 2011 بر روی سایت اینترنتی مجله JMIR منتشر شد و در حال حاضر، با کمک نویسندهای JMIR تحت پیش‌آزمایش است. در واقع، از نویسندهای JMIR درخواست شده است چنان‌چه گزارشی از یک RCT را به مجله JMIR ارسال می‌کنند، یک نسخه الکترونیک از چکلیست تکمیل شده را نیز از طریق یک پرسشنامه آنلاین ارسال نمایند. در این پرسشنامه، نویسندهای RCT‌ها باید بخش‌هایی از متن پیش‌نویس مقاله‌اشان را منعکس کنند که متناظر با هر یک از عنوان‌های چکلیست است؛ و یا این که اگر عنوانی از چکلیست برای مقاله آن‌ها کاربرد ندارد، دلیل آن را به اختصار شرح دهند. همچنین، از آن‌ها خواسته می‌شود (داوطلبانه) که اهمیت هر یک از عنوان‌های را در ارتباط با کارآزمایی خودشان، امتیازدهی کنند. انتظار نویسندهای این مقاله CONSORT-EHEALTH آن است که نسخه بعدی راهنمای CONSORT-EHEALTH (نسخه 2.0) در اوایل سال 2013 منتشر شود؛ سعی بر آن است که در نسخه جدیدتر، بازخوردهای دریافت شده از نویسندهای حقیقی RCT‌ها در بازبینی در نظر گرفته و لحاظ شود؛ ضمن آن که این امکان وجود دارد که از مشارکت آنان، با گنجاندن نامشان در کمیته بازبینی راهنمای CONSORT-EHEALTH قدردانی به عمل آید. با این روش، می‌توان اطمینان حاصل کرد که نسخه بعدی راهنمای CONSORT-EHEALTH، تجارب کاربران واقعی خود را منعکس خواهد کرد.

مسایل خاص در گزارش‌دهی کارآزمایی‌های eHealth و مثال‌هایی از عنوان‌های راهنمای بالینی: در ادامه، مثال‌هایی از عنوان‌های زیرعنوان‌هایی که بخشی از این راهنمای گزارش‌دهی هستند، ارایه خواهد شد.

به عنوان نمونه، با هدف تکرارپذیری و امکان مقایسه (در بستر انجام پژوهش) و همچنین پیاده‌سازی و توزیع نتایج پژوهش (در بستر عمل)، توصیف و مستندسازی دقیق و با ذکر جزئیات مداخله مورد نظر در کارآزمایی، ضروری است. چکلیست کانسورت، صرفاً دارای یک عنوان منفرد در زمینه توصیف و تشریح مداخله است (عنوان ۵: «مداخلات انجام شده بر روی هر یک از گروه‌ها را با جزئیات کافی، شامل چگونگی و زمان واقعی انجام مداخله‌ها، توصیف کنید؛ به گونه‌ای که امکان تکرار کارآزمایی را فراهم نماید»). چنین الزامی ممکن است برای

پاییز 94، دوره هجدهم، شماره سوم، پیاپی 70

کانسورت EHEALTH: مراجع و منابع کلیدی که برای تدوین عنوان مورد استفاده قرار گرفتند، عبارت بودند از: عنوانی اصلی راهنمای کانسورت (به ویژه آن بخشی که شامل ضمیمه درمان‌های غیردارویی می‌شد) (7): مقاله‌ای که قبلاً توسط eHealth Eysenbach درباره موضوعات اختصاصی RCT‌های eHealth درباره Baker و همکاران که درباره مرتبط بودن معیارهای گزارش‌دهی کانسورت برای کارآزمایی‌های eHealth منتشر شده بود (13) و همچنین، نسخه‌ای از مقاله اخیر Proudfoot و همکاران (15). محتوای یکی از راهنمایاهای موجود برای مطالعات ارزشیابی در انفورماتیک سلامت (16) بسیار کلی‌تر از آن بود که بتواند مورد استفاده قرار گیرد. مطالعات مرور نظاممند که در این حوزه انجام شده بودند (2، 3، 17 و 18) چارچوب‌های کاربردی بیشتری را برای تعیین عنوانی که باید گزارش شوند، فراهم کردند.

بر مبنای مراجع و منابع فوق، نویسندهای این مقاله در ابتدا یک ابزار اولیه (CONSORT- EHEALTH نسخه 1.5) را منتشر کردند که شامل 53 زیرعنوان اضافه بود که 25 عنوان استاندارد کانسورت را تسریح یا تقویت می‌کرد. زیرعنوان‌هایی که مخصوص eHealth بودند با اعداد رومی مشخص شدند (مثلاً آیتم 2a کانسورت، دو زیرعنوان اضافه داشت که با 2a-i و 2a-ii نمایش داده شدند). نویسندهای این مقاله، دو عنوان را به 25 عنوان اصلی کانسورت اضافه کردند (عنوان 26 درباره اصول اخلاقی و عنوان 27 در زمینه افشاءی تضاد منافع)؛ این دو عنوان، جزو چکلیست‌های اصلی کانسورت نیستند و امکان طبقه‌بندی آن‌ها در قالب هیچ یک از عنوان‌های موجود وجود نداشت. این ابزار در ماه مارس سال 2011 منتشر شد و از خوانندگان مجله JMIR و ذینفعان عرصه eHealth درخواست شد تا نظرات خود را درباره این ابزار ارایه کنند و برای اهمیت هر زیرعنوان، امتیازی را در نظر بگیرند.

در فاصله 4 آوریل تا 7 ژوئن 2011، نویسندهای این مقاله 55 پاسخ به کانسورت نسخه 1.5 (نخستین دور دلفی) را دریافت کردند. اکثر پاسخ‌دهندگان، با تمام زیرعنوان‌ها موافق بودند. تنها یک زیرعنوان پس از نخستین دور دلفی، حذف شد («گزارش کنید که چطور وابستگی‌های سازمانی به شرکت‌کنندگان بالقوه در رسانه‌های eHealth نمایش داده می‌شود؛ زیرا وابستگی به بیمارستان‌ها یا دانشگاه‌های شناخته شده و معتبر، ممکن است بر میزان مشارکت داوطلبانه در یک مداخله، استفاده از آن یا واکنش‌دهی به آن، تأثیر داشته باشد»). بنابراین، مستند فعلی

علمی - پژوهشی. به جز این مورد که ضمیمه عنوان ۵ مربوط به توصیف مداخلات شد، افزودنی‌های و ضمیمه‌های دیگری هم برای عنوانین فعلی کانسورت تدوین شدند.

تعدادی از زیرعنوان‌های راهنمای در ارتباط با موضوع مهم ریزش (عدم استفاده) و هم‌چنین استفاده (به کار گرفتن، «دوز»، پاییندی) از مداخله هستند (۱۹). از آن جایی که شرکت کنندگان در مداخلات مبتنی بر وب، معمولاً کترول کامل بر استفاده یا عدم استفاده از مداخله دارند و یا بر این که چگونه و به چه مدت برنامه کاربردی را به کار می‌گیرند، در دنیای واقعی، ارزیابی مداخلات مبتنی بر وب و تفسیر گزارش‌های مربوط به اثربخشی (یا عدم اثربخشی) آن‌ها، معمولاً تحت الشاع این حقیقت قرار می‌گیرد که در صد قابل توجهی از شرکت کنندگان ممکن است از کارآزمایی خارج شده باشند (عدم استفاده یا ریزش ناشی از مفقود شدن در پیگیری‌های بعدی) (۱۹). هر چند که عدم پاییندی به مداخله تجویزشده، از چالش‌های کارآزمایی‌های دارویی نیز هست، اما میزان ریزش در کارآزمایی‌های مبتنی بر اینترنت، نسبت به کارآزمایی‌هایی چهره‌به‌چهره به طور قابل توجهی بیشتر است. به دلیل این که اثربخشی در این کارآزمایی‌ها معمولاً وابسته به استفاده واقعی کاربران از مداخله و تابعی از آن است، پژوهشگران باید معیارها و شاخص‌های استفاده (پاییندی) و یا عدم استفاده (ریزش) از مداخله را اندازه‌گیری و گزارش کنند. این اندازه‌گیری‌ها را با انواع و اقسام شاخص‌ها می‌توان انجام داد، از جمله تعداد موارد ورود به سایت (login) یا میانگین مدت زمان حضور یا کاربری سایت. البته، حتی این شاخص‌ها و معیارهای به ظاهر ساده، نیازمند توضیحات اضافی است. به عنوان نمونه، اگر پژوهشگران میانگین مدت زمان حضور در سایت را گزارش کنند، این شاخص ممکن است به دلیل خارج نشدن از سایت (logout) از سوی برخی از شرکت کنندگان، دچار چولگی (skewness) شده باشد؛ بنابراین، در موارد این چنینی، اطلاعات تکمیلی و بیشتری مثل سیاست‌های سایت در زمینه زمان وقفه مثل timeout policy (نیز باید ارایه شود (مثلاً خروج خودکار از سایت بعد از ۱۵ دقیقه غیرفعال بودن) تا امکان مقایسه دقیق در طول کارآزمایی و تفسیر صحیح یافته‌ها فراهم شود. نویسنده‌ان مقاله حاضر پیشنهاد می‌کنند در زیرعنوان ۶a-ii (سط داده شده عنوان ۶ کانسورت «پی‌آمدها»)، پژوهشگران تعریف عملی و نحوه اندازه‌گیری کاربری، استفاده و به کار گرفتن مداخله را علاوه بر توصیف، نحوه اندازه‌گیری شاخص‌های اصلی پی‌آمد، را تشریح کنند. در ضمن تقاضا می‌شود که در زیرعنوان ۱-۱۷

کارآزمایی‌های دارویی کافی باشد؛ چرا که در این نوع کارآزمایی‌ها، معمولاً ذکر نام دارو به همراه شیوه تجویز و دوز مصروفی آن، به سادگی به عنوان توصیف مداخله، پذیرفتی است. اما چنین چیزی برای مداخلات eHealth و mHealth کافی نیست؛ چرا که مداخلات اخیر، معمولاً پیچیده هستند و نیازمند ذکر جزئیات بیشتری هستند تا دیگران بتوانند آن‌ها را تکرار کنند. به همین دلیل، نویسنده‌ان این مقاله، زیرفهرست جزئی‌تری را تدوین کردند که ضمیمه‌ای برای عنوان ۵ کانسورت است و اجزای مورد نیاز و مطلوب برای گزارش دهی را به منظور توصیف بخش‌های کارکردی و سایر ویژگی‌های مهم مداخلات مبتنی بر وب، فهرست می‌کند.

دو مورد از این زیرعنوان‌ها (۵-vi و ۵-vii) راجع به موضوع محافظت دیجیتال (digital preservation) یک مداخله است که یکی دیگر از جنبه‌های منحصر به فرد در کارآزمایی‌های eHealth و mHealth پژوهشگران بتوانند فرضیه‌های علمی و یافته‌های کارآزمایی‌ها را تأیید یا رد کنند، اجزای کلیدی مداخلات باید موجود و در دسترس باشند؛ در حالت ایده‌آل، این دسترسی باید به شیوه کدهای متن- باز (open source) باشند یا حداقل؛ در حال ایده‌آل، این دسترسی (WebCitation.org) باشد یا صفحات رابط (Internet Archive) یا یک آرشیو مبتنی بر وب (مثل JMIR) یا کدها و شفافیت کامل الگوریتم‌ها، باعث ایجاد اختلاف نظرهایی در بین پاسخ‌دهندگان گردید؛ چرا که (گروهی از آن‌ها معتقد بودند) برخی از برنامه‌های کاربردی eHealth ممکن است کاربری تجاری داشته باشند و این که انتشار عمومی الگوریتم‌های خصوصی و تحت مالکیت تجاری، ممکن است نگرانی‌هایی را ایجاد نماید. هر چند که JMIR انتشار کدهای متن- باز را به همراه مقاله اصلی توصیه و تشویق می‌کند؛ به نظر نمی‌رسد که در حال حاضر اجتماعی بر روی این قضیه وجود داشته باشد که بتوان این الزام را برای تمام مجلات علمی- پژوهشی ضروری شمرد. به هر حال، حتی اگر کدها به صورت متن- باز در دسترس قرار داده نشوند، گزارش کارآزمایی باید حاوی جزئیات کافی (و ترجیحاً تصاویری از صفحه نمایش) باشد که به دیگران امکان دهد یافته‌های کلیدی مطالعه را تکرار، تأیید یا رد کنند؛ در غیر این صورت، نمی‌توان چنین گزارش‌هایی را به عنوان پژوهش‌های علمی شناخت و نتایج آن‌ها باید در یک مجله تجاری- ترویجی منتشر شوند، نه یک مجله

سمت سوق دهد که «دلیل» این اتفاقات چیست. در نهایت، برای تقویت امکان بازیابی (پیدیدارسازی) این نوع از مقالات در PubMed و سایر بانک‌های اطلاعاتی کتابشناختی، نویسنده‌گان مقاله حاضر پیشنهاد می‌کنند واژه‌های کلیدی ترجیحی در عنوان یا خلاصه مقاله گنجانده شوند (به عنوان مثال، «مداخله مبتنی بر وب» یا «مداخله تلفن همراه»). این توصیه‌ها بر مبنای تحلیل فراوانی واژه‌های مورد استفاده در مطالعات اخیر مطرح شده‌اند.

بحث

تصویر می‌شود که انتشار این راهنمای آگوست 2010، تأثیر قابل توجهی بر کیفیت گزارش‌هایی خواهد داشت که مداخله‌های مبتنی بر وب را ارزشیابی می‌نمایند. این ارتقای کیفیت می‌تواند منجر به مروههای نظاممند بهتری شود و ترجمان دانش را تسهیل نماید. امیدواریم که این راهنمای نقطه آغاز مفیدی برای دستیابی به چارچوبی برای بحث پیرامون کیفیت کارآزمایی‌های eHealth باشد. از جمله این که این کارآزمایی‌ها چگونه باید اجرا شوند؛ چه مواردی در دستورالعمل‌ها، پروپوزال‌های دریافت بودجه پژوهشی و نظامهای ثبت کارآزمایی‌ها بهتر است گزارش شوند؛ و هم‌چنین این که کارآزمایی‌ها چگونه باید در مطالعات مرور نظاممند، طبقه‌بندی و ترکیب شوند.

عناصر این راهنمای می‌تواند برای پژوهشگرانی از سایر رشته‌ها که از روش‌های مبتنی بر وب برای نامنوبی شرکت کنندگان مطالعات و جمع‌آوری داده‌ها استفاده می‌کنند، مفید باشد؛ حتی اگر پژوهش آن‌ها، متصرکر از ارزشیابی یک مداخله ایترنی یا تلفن همراه نباشد. بسیاری از اجزای این راهنمای (خصوصاً بخشی که زیرعنوان‌های مداخله را توصیف می‌کند)، نه تنها در کارآزمایی‌های تصادفی شده، بلکه برای هر نوع گزارش ارزشیابی می‌تواند کارآمد باشد.

گرچه JMIR اولین مجله‌ای است که این راهنمای را پذیرفته است، امید است که سایر مجله‌ها و مؤسسه‌سازی نیز از آن حمایت کنند و در عمل از آن استفاده نمایند. به نویسنده‌گان توصیه می‌شود که فارغ از مجله‌ای که مقاله‌شان را در آن چاپ خواهند کرد، پژوهش‌ها (و دستورالعمل‌های پژوهشی) خود را بر اساس این راهنمای CONSORT-EHEALTH گزارش نمایند. ما نویسنده‌گانی را که گزارش آنان بر اساس این راهنمای آماده شده است، تشویق می‌کنیم که در بخش منابع مقالات یا گزارش خود به این راهنمای (این مقاله) ارجاع دهند تا به این وسیله، انتشار این راهنمای و انعکاس بهترین نمونه‌های گزارش دهی، تسهیل شود.

(بسط داده شده عنوان 17 کانسورت «پی‌آمدها و تخمین»)، پی‌آمدهای کاربری و به کارگیری مداخله ضرورتاً گزارش شوند. در زیرعنوان 12 کانسورت («روش‌های آماری»)، اختصاراً باید تشریح شود که از نظر آماری، چه کاری برای مقادیر مفقود (missing) ناشی از ریزش و خروج شرکت کنندگان از مطالعه انجام شده است (20). علاوه بر نمودار رایج کانسورت که فلودیاگرام شرکت کنندگان مطالعه است، نویسنده‌گان مقاله حاضر قویاً پژوهشگران را تشویق می‌کنند که نمودار ریزش (کانسورت eHealth عنوان-i 13b-i) را در بخش نتایج بگنجانند که رفتار شرکت کنندگان به سایت (login) را در تمام گروه‌ها در طی زمان به شکل یک منحنی بقا نمایش دهد (19).

توصیف جامع راهبردهای مبتنی بر وب برای جذب شرکت کنندگان و روش‌های جمع‌آوری داده‌ها، جزء حوزه‌های دیگری بود که به نظر نویسنده‌گان مقاله حاضر، نیاز به عنایوی در راهنمای CHERRIES که پیش‌تر در زمینه گزارش دهی بررسی‌های پیمایشی مبتنی بر وب منتشر شده بود (12)، می‌تواند رهنمودهای تکمیلی را فراهم نماید و می‌توان آن را به عنوان مکمل زیرعنوان-i 6a-i در نظر گرفت؛ این زیرعنوان، مربوط به حالت رایجی است که پی‌آمدها از طریق پرسش نامه‌های آنلاین اندازه‌گیری و ثبت می‌شوند.

روند تأسیس‌باری که در حال حاضر به وجود آمده این است که گزارش‌های کارآزمایی بالینی تصادفی شده، به «واحدهای کوچک قابل چاپ» شکسته شوند. به عنوان نمونه، یک مقاله حاوی نتایج پی‌آمدهای اولیه RCT، مقاله دیگر حاوی نتایج کاربری و مقاله سوم راجع به تحلیل کیفی بازخوردهای شرکت کنندگان مطالعه است. در مجله JMIR، سیاست سخت‌گیرانه‌ای اتخاذ شده است تا جلوی این شیوه «انتشار تکه‌تکه» را بگیرد؛ رفتاری که موجب ایجاد محدودیت در تفسیر یافته‌های کلی کارآزمایی‌ها می‌شود. مجله JMIR انتشار این مقالات چند پاره را صرفاً در شرایط بسیار خاص قبول می‌کند؛ ترجیحاً وقتی که گزارش‌ها همراه با یکدیگر ارسال شده‌اند و قرار است در یک شماره مشخص از مجله چاپ شوند. نگارش یک مقاله جداگانه برای یک ارزیابی کیفی عمیق ممکن است CONSORT-EHEALTH ضروری باشد. اما تعدادی از عنوان‌ین 6a-ii (19-ii) به نویسنده‌گان مقالات یادآوری می‌کند که هر گزارش ارزیابی eHealth باید برخی از تحلیل‌های کیفی را داشته باشند، خصوصاً چنان‌چه عدم استفاده از برنامه‌های کاربردی اتفاق افتاده یا اثرات بالقوه نامطلوب مشاهده شده است، چرا که این نوع اتفاقات، باید تمرکز گزارش کارآزمایی را به این

- تشکیل یک کارگروه با تجربه برای رهبری بهبود و توسعه این راهنمای CONSORT-EHEALTH
- تحلیل نظام مند RCT‌های مبتنی بر وب که پس از انتشار این راهنمای به چاپ رسیده‌اند، به منظور ارزشیابی تأثیر چک‌لیست و تعیین کاستی‌ها و نیاز به افزودن عنوانین جدید؛
- ساخت بانک اطلاعات از کارآزمایی‌ها با قابلیت جستجو، بر اساس اطلاعاتی که نویسنده‌گان JMIR در هنگام تکمیل چک‌لیست CONSORT-EHEALTH ثبت می‌کنند.
- لازم است مجددًا تأکید شود که توسعه CONSORT-EHEALTH یک فرآیند تکرارشونده و مداوم است که نیازمند استفاده از نظرات طیف وسیعی از ذی‌نفعان است که ما از آن استقبال می‌کنیم. ما تلاش خود را برای تأمین منابع مالی به منظور تداوم این کار مهم ادامه می‌دهیم و معتقدیم که این کار برای توسعه «هنر و علم» مداخلات مبتنی بر اینترنت و تلفن همراه، ضروری است.

عنوان مقاله اصلی انگلیسی و نحوه ارجاع به آن

Eysenbach G, and CONSORT-EHEALTH Group. CONSORT-EHEALTH: Improving and Standardizing Evaluation Reports of Web-based and Mobile Health Interventions. *Journal of Medical Internet Research*, 2011 Oct-Dec; 13(4): e126.

References

- 1- Ritterband LM, Andersson G, Christensen HM, Carlbring P, Cuijpers P. Directions for the International Society for Research on Internet Interventions (ISRII). *J Med Internet Res* 2006;8(3):e23.
- 2- Wantland DJ, Portillo CJ, Holzemer WL, Slaughter R, McGhee EM. The effectiveness of Web-based vs. non-Web-based interventions: a meta-analysis of behavioral change outcomes. *J Med Internet Res* 2004 Nov;10(4):e40.
- 3- Griffiths F, Lindenmeyer A, Powell J, Lowe P, Thorogood M. Why are health care interventions delivered over the internet? A systematic review of the published literature. *J Med Internet Res* 2006;8(2):e10.
- 4- Eysenbach G. Issues in evaluating health websites in an Internet-based randomized controlled trial. *J Med Internet Res* 2002 Dec;4(3):e17.
- 5- Bessell TL, McDonald S, Silagy CA, Anderson JN, Hiller JE, Sansom LN. Do Internet interventions for consumers cause more harm than good? A systematic review. *Health Expect* 2002 Mar;5(1):28-37.
- 6- El Emam K, Jonker E, Sampson M, Krleza-Jeric K, Neisa A. The use of electronic data capture tools in clinical trials: Web-survey of 259 Canadian trials. *J Med Internet Res* 2009;11(1):e8.
- 7- Boutron I, Moher D, Altman DG, Schulz KF, Ravaud P, CONSORT Group. Extending the CONSORT statement to randomized trials of non pharmacologic treatment: explanation and elaboration. *Ann Intern Med* 2008 Feb 19;148(4):295-309.
- 8- Zwarenstein M, Treweek S, Gagnier JJ, et al. Improving the reporting of pragmatic trials: an extension of the CONSORT statement. *BMJ* 2008;337:a2390.
- 9- Moher D, Hopewell S, Schulz KF, et al. CONSORT 2010 explanation and elaboration: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. *BMJ* 2010;340:c869.
- 10- Campbell MK, Elbourne DR, Altman DG, CONSORT group. CONSORT statement: extension to cluster randomised trials. *BMJ* 2004 Mar 20;328(7441):702-708.
- 11- Piaggio G, Elbourne DR, Altman DG, Pocock SJ, Evans SJ, CONSORT Group. Reporting of non-inferiority and equivalence randomized trials: an extension of the CONSORT statement. *JAMA* 2006 Mar 8;295(10):1152-1160.
- 12- Eysenbach G. Improving the quality of Web surveys: the Checklist for Reporting Results of Internet E-Surveys (CHERRIES). *J Med Internet Res* 2004 Sep 29;6(3):e34.
- 13- Baker TB, Gustafson DH, Shaw B, et al. Relevance of CONSORT reporting criteria for research on eHealth interventions. *Patient Educ Couns* 2010 Dec;81 Suppl:S77-S86.

چک‌لیست این مطالعه، تنها اولین گام در این مسیر است. با توجه به این که فن‌آوری دائمًا و به سرعت در حال تغییر است و اساس گزارش دهی مداخلات eHealth و mHealth بر این موضوع قرار دارد که چه چیزی از نظر فن‌آوری، میسر خواهد بود، ضرورت دارد که این چک‌لیست، در فواصل کوتاه‌تری نسبت به سایر راهنمایی‌های گزارش دهی (مثل راهنمای STRICTA (21)) روزآمد شود. گنجاندن یک بخش ارزشیابی نیز در این فرایند ضروری خواهد بود؛ در غیر این صورت، درخواست از نویسنده‌گان، مجلات و سردبیران برای تأیید و حمایت از این راهنمای، ضرورتی نداشت.

به منظور فراهم کردن مجموعه‌ای از شواهد علمی که از استفاده از این راهنمای حمایت می‌کنند، نویسنده‌گان قصد دارند که چک‌لیست CONSORT-EHEALTH را با اقدامات زیر ارزشیابی و نقد کرده و توسعه دهند:

- پیاده‌سازی آزمایشی در JMIR که شامل جمع‌آوری داده‌ها از نویسنده‌گان RCT‌ها است؛
- تحلیل گذشته‌نگر نمونه‌ای تصادفی از RCT‌های مبتنی بر CONSORT-EHEALTH و که پیش از انتشار چک‌لیست منتشر شده‌اند (و ادامه دارد)؛
- نگارش سند تفصیل و تشریح راهنمای؛
- را اندازی یک سایت اینترنتی و یک جعبه‌بازار تعاملی؛

- 14- Moher D, Schulz KF, Simera I, Altman DG. Guidance for developers of health research reporting guidelines. PLoS Med 2010 Feb;7(2):e1000217
- 15- Proudfoot J, Klein B, Barak A, et al. Establishing Guidelines for Executing and Reporting Internet Intervention Research. Cognitive Behaviour Therapy 2011;40:82-97.
- 16- Talmon J, Ammenwerth E, Brender J, De Keizer N, Nykänen P, Rigby M. STARE-HI-Statement on reporting of evaluation studies in Health Informatics. Int J Med Inform 2009 Jan;78(1):1-9.
- 17- Webb TL, Joseph J, Yardley L, Michie S. Using the internet to promote health behavior change: a systematic review and meta-analysis of the impact of theoretical basis, use of behavior change techniques, and mode of delivery on efficacy. J Med Internet Res 2010;12(1):e4.
- 18- Cugelman B, Thelwall M, Dawes P. Online interventions for social marketing health behavior change campaigns: a meta-analysis of psychological architectures and adherence factors. J Med Internet Res 2011;13(1):e17.
- 19- Eysenbach G. The law of attrition. J Med Internet Res 2005;7(1):e11.
- 20- Blankers M, Koeter MWJ, Schippers GM. Missing data approaches in eHealth research: simulation study and a tutorial for non-mathematically inclined researchers. J Med Internet Res 2010;12(5):e54.
- 21- MacPherson H, Altman DG, Hammerschlag R, et al. Revised STAndards for Reporting Interventions in Clinical Trials of Acupuncture (STRICTA): extending the CONSORT statement. J Altern Complement Med 2010 Oct;16(10):ST1-S14.

Please cite this article as follows:

Ahmadvand A, Hanifiha M, Ganjizadeh A, Mokhtarnia M, Maghsoudi Darbeh P. (*Translation*). Eysenbach G, and CONSORT-EHEALTH Group. CONSORT-EHEALTH: Improving and Standardizing Evaluation Reports of Web- based and Mobile Health Interventions. Hakim Health Sys Res 2015; 18(3): 256- 263.
