

بررسی میزان مقتضی بودن خدمات سی‌تی اسکن مهره‌های کمری در بیمارستان رفراز ترومای شهر شیراز با استفاده از روش مناسبت رند

***زهراء کاووسی^۱**, عاطفه اسفندیاری^۲, غلامرضا فرزانگان^۳, ابوذر دهقانی^۴, هدایت سالاری^{۲*}

۱- مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی شیراز، شیراز، ایران-۲- استادیار، دکترای تخصصی سیاست‌گذاری سلامت، گروه مدیریت و سیاست‌گذاری سلامت، دانشکده پزشکی، دانشجوی علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران-۳- دانشیار، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، تهران، ایران-۴- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

* نویسنده مسئول: بوشهر، خیابان معلم، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده پزشکی تلفن و نامبر: ۰۶۵۷-۳۳۳۲-۰۷۷- پست الکترونیک: salarihedayat@gmail.com

دریافت: ۹۶/۰۷/۱۲ پذیرش: ۹۶/۱۰/۷

چکیده

مقدمه: مطالعات نشان می‌دهند در صد قابل توجهی از تصویربرداری‌های تشخیصی غیرضروری می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی مناسبت تجویزهای سی‌تی اسکن برای تشخیص علل مهره‌ای کمر درد بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان رفراز ترومای دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‌باشد.

روش کار: جامعه پژوهش عبارت است از تمام بیمارانی که در سال ۱۳۹۵ برای انجام سی‌تی اسکن مهره‌ای کمری به بیمارستان ترومای مراجعه کرده بودند که ۲۸۱ نفر از آنها به عنوان نمونه مطالعه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای سنجش مناسبت تجویزهای در این پژوهش، اندیکاسیون‌های تدوین شده با استفاده از روش تعیین مناسبت رند^۱ برای سی‌تی اسکن مهره‌ای کمری بوده است.

یافته‌ها: حدود ۶۳٪ مراجعه‌کنندگان مرد و ۳۷٪ زن بودند. از ۲۸۱ مورد تجویز سی‌تی اسکن برای بیماران مبتلا به کمر درد، ۱۶۲ (۵۷/۷٪) مناسب، ۹۲ (۳۲/۷٪) نامناسب و ۲۷ مورد (۶/۹٪) نامناسب بودند. رابطه بین متغیرهای وضعیت معاینه، نوع تخصص پزشک و موسسه ارجاع‌دهنده با وضعیت مناسبت تجویزهای معنادار بود.

نتیجه گیری: راهنمایی بالینی تدوین شده از طریق «روش مناسبت رند» می‌تواند ابزار کاربردی مناسبی برای ارایه‌دهنده‌گان، برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران نظام سلامت و مؤسسات بهمنه درمان؛ بهویژه در کشورهای در حال توسعه در راستای کاهش خدمات و مراقبت‌های نامناسب و غیرضروری، ارتقای کیفیت و کاهش بار مالی ناشی از خدمات غیرضروری باشد. پیشنهاد می‌شود بهمه‌ها و سایر نهادهای پرداخت‌کننده مناسبت تجویزهای را به عنوان معیاری جهت پرداخت به پزشکان قرار دهنند.

گل واژگان: مناسبت، سی‌تی اسکن، درد پایین کمر، روش مناسبت رند

مقدمه

است (۳). در واقع چنان‌چه این خدمات بی‌رویه مورد استفاده قرار نگیرند، نگرانی‌هایی در رابطه با مصرف بهینه منابع به وجود می‌آورند (۴). یکی از خدماتی که در صنعت بهداشت و درمان به سرعت در حال رشد است؛ خدمات تشخیصی می‌باشد و سیاست‌گذاران غرب، کاهش این‌گونه خدمات را به عنوان راهی برای کاهش هزینه‌های خدمات درمانی و افزایش کیفیت خدمات می‌دانند (۵ و ۶). رابطه‌ای روشن بین در دسترس بودن واحد تصویربرداری و استفاده از آن‌ها وجود دارد

امروزه استفاده از خدمات تشخیصی پرهزینه با تکنولوژی سطح بالا به طور اساسی افزایش یافته است، استفاده از این تکنولوژی‌ها بدون شک منجر به منافعی برای بیماران است (۱). استفاده مناسب از این فناوری‌ها می‌تواند به تشخیص و درمان بیماری‌ها کمک مؤثری نماید (۲). با توجه به قیمت بالای این فناوری‌ها و محدود بودن منابع، خرید و استفاده از آن‌ها باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری از جمله افزایش بیش از حد هزینه‌های بهداشت و درمان شده

^۱ RAND Appropriateness Method (RAM)

در ادامه کار با توجه به نظر مشاورین تخصصی طرح و پژوهشگر و بر طبق ابزار^۳ AGREE دو راهنمای بالینی معتبر انتخاب شدند.

-۲- استخراج اندیکاسیون‌ها: پس از انتخاب دو گایدلاین معتبر، تمام سناریوها و شاخص‌های موجود در این گایدلاین‌ها استخراج و با هم تفیق شدند.

-۳- انتخاب اعضای پانل متخصصان: با انجام بررسی‌ها یک لیست از متخصصان مرتبط با تجویز سی‌تی‌اسکن که درگیر تشخیص و درمان بیماری‌های مهره‌های کمری می‌باشند، انتخاب شدند. این متخصصان به ترتیب داشتن بیشترین ارتباط با پروسیجر سی‌تی‌اسکن مهره‌های کمری عبارتند از: متخصصان جراحی مغز و اعصاب، ارتپید، نورولوژیست، رادیولوژیست، طب فیزیکی و توانبخشی و روماتولوژیست.

-۴- مرحله اول پانل متخصصان: پس از استخراج سناریوهای بالینی و انتخاب و اخذ موافقت ۹ نفر متخصص برای شرکت در پانل نوبت به امتیازدهی به سناریوها توسط اعضای پانل رسید. در این مرحله، سناریوهای استخراج شده در قالب فرم شماره ۱ به همراه ابزار نمره‌دهی تنظیم گردیده و توسط پژوهشگر به هریک از متخصصان تحویل داده شد. از متخصصان خواسته شد تا به هر یک از سناریوها طبق قضاوت حرفه ایشان و مطالعه مقامات به روز، امتیازی بین عدد ۱ تا ۹ داده شود. برای متخصصان توضیح داده شد که عدد ۱ تا ۳ به معنی نامناسب بودن سناریو، عدد ۴ تا ۶ به معنی نامطمئن و عدد ۷ تا ۹ به معنی مناسب هستند. در این لیست همچنین متخصصان مجاز به اضافه کردن سناریوهایی طبق تجربه و مطالعات خود بودند.

-۵- مرحله دوم پانل متخصصان: گام دوم پانل نشست علمی بود که حدود ۶ ساعت به طول انجامید. در این گام سناریوها توسط رهبر پانل خوانده شده و هریک از سناریوها به طور جداگانه توسط اعضاء به بحث گذاشته شدند و اعضاء مجاز به تغییر امتیاز قبلی بودند.

عمرحله آنالیز نمرات اعضای پانل: در مرحله بعد آنالیز داده‌ها سناریوها بر اساس وضعیت مناسبت در ۳ گروه قرار گرفتند. سناریوهای مناسب: سناریوهایی که میانه نمره داده شده اعضا در طیف ۹-۷ قرار داشته و کاملاً مورد توافق باشند. نامطمئن: سناریوهایی که میانه نمره داده شده اعضا در طیف ۶-۴ قرار داشته و یا در سایر طیفها مورد اجماع و توافق قرار نگرفته باشند. نامناسب: سناریوهایی که میانه نمره داده شده اعضا در طیف ۳-۱ قرار داشته و مورد توافق و اجماع کامل باشند.

پس از انجام این مراحل، مطالعه وارد فاز دوم شد.

(۷). تشخیص بهتر بیماری است و این که بیمار اطمینان خاطر بیشتری پیدا می‌کند و همچنین ورود نامحدود و بدون کنترل این فناوری‌ها موجب تقاضای القایی از طرف ارایه‌کنندگان خدمت و مصرف بی‌رویه و غیرضروری این خدمات می‌شود (۸). در بسیاری از موارد این فناوری‌ها نسبت به فناوری‌های پیشین برتری ندارند و شواهدی در مورد بهبود نتایج بیمار در استفاده از آنها وجود ندارد (۹) مطالعات نشان داده‌اند، تقریباً ۳۰٪ از روش‌های تصویربرداری که با تکنولوژی پیشرفته کار می‌کنند غیرضروری بوده است (۱۰).

یکی از این فناوری‌های تشخیصی که امروزه استفاده از آن رواج یافته است؛ سی‌تی‌اسکن می‌باشد. گرچه تصویربرداری با سی‌تی‌اسکن بدون درد و خونریزی است ولی به جهت آن که منبع انرژی آن اشعه ایکس یعنی یک اشعه یونیزه کننده است و از سوی دیگر به جهت هزینه فراوانی که بر سیستم اقتصادی کشور تحمیل می‌کند؛ انجام آن باید بر مبنای اصول مسلم علمی و تنها مطابق نظر پزشک معالج باشد. بدیهی است وقتی سود و زیان حاصل از انجام سی‌تی‌اسکن توسط یک پزشک ماهر و خبره سنجیده شود، می‌توان رای پزشک مذکور را جهت انجام یا عدم انجام این آزمایش مدنظر قرار داد (۱۱) این فناوری به طور روزافزونی در بسیاری از نقاط دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. در بیشتر کشورها قبل از ورود فناوری، با استفاده از روش نظاممند ارزیابی فناوری سلامت با دقت و حساسیت نسبت به مجوز ورود فناوری‌های جدید و نحوه استفاده از آن‌ها بررسی و اقدام می‌شود تا در حد امکان از منابع موجود به صورت بهینه استفاده شود (۱۲). با توجه به بالا رفتن هزینه‌های بخش بهداشت و درمان و استفاده بی‌رویه از این تجهیزات، لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان ضروری بودن خدمات سی‌تی‌اسکن مهره‌های کمری در بیمارستان رجایی انجام گرفت تا با اطلاعات حاصل بتوان در جهت کاهش موارد غیرضروری تلاش نمود.

روش کار

مطالعه حاضر یک مطالعه تلفیقی^۲ کیفی- کمی بود که در سال ۱۳۹۵ در شیراز انجام شده است. در فاز کیفی از روش مناسبت رند استفاده شد و اندیکاسیون‌های لازم برای سنجیدن مقتضی بودن تجویزها تدوین شد. مراحلی که در این فاز طی شد به شرح زیر می‌باشد.

-۱- انتخاب راهنمایی‌های معتبر و مناسب: ابتدا با انجام جستجوی گسترده توسط راهنمایی‌های بالینی دردسترس در زمینه‌ی سی‌تی‌اسکن مهره‌های کمری یافت شد.

² Mixed Method

^۳ Appraisal of Guidelines for Evaluation and Research

از طریق محاسبه الگای کرونباخ^۴ تأیید شد. پژوهشگر پس از مراجعه به مرکز سی‌تی‌اسکن بیمارستان رجایی؛ پرسشنامه را بین بیماران توزیع می‌کرد. داده‌های حاصل با استفاده از نرمافزار SPSS 20 و آماره‌های توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها

۲۸۱ پرسشنامه تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که اکثر شرکت‌کنندگان در پژوهش مرد (۶۲/۶٪)، در گروه سنی ۲۸-۱۴ سال (۳۶/۷٪)، دارای شغل آزاد (۳۵/۹٪)، دارای سطح تحصیلات راهنمایی تا دیپلم (۴۳/۱٪) و دارای درآمد بین ۱۰-۲ میلیون تومان (۶۳/۷٪) بودند. وضعیت بیمه پاسخگویان ۸۹/۹۳٪ بیمه داشتند و ۰/۷٪ فاقد بیمه بودند که از این بین ۴۵/۲٪ بیمه تکمیلی داشتند و ۵۴/۸٪ بیمه تکمیلی نداشتند (جدول ۱).

فاز دوم از نظر روش‌شناسی از نوع مطالعات توصیفی- مقطعي و از لحاظ هدف، کاربردی می‌باشد. در این پژوهش به منظور جمع‌آوری داده‌ها از بیمارستان رجایی شیراز به عنوان مرکز ترومای جنوب کشور استفاده شد. جامعه‌ی آماری پژوهش، ۲۸۱ نفر از بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان بودند، نمونه‌گیری به روش آسان در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که پس از مشورت و رایزنی‌های لازم با اساتید، تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه شامل دو قسمت شامل اطلاعات دموگرافیک بیماران و سؤالات اختصاصی بود و یک سؤال آخر که طبق معاینات و شرح حال پژوهش از بیمار جواب داده می‌شد و مناسب تشخیص را نشان می‌دهد. برای جواب دادن به مناسبت تجویزها به اندیکاسیون‌های استخراج شده در فاز اول مراجعه شد. روایی صوری و محتوای این پرسشنامه توسط اساتید و صاحب‌نظران در این حیطه و پایایی آن

جدول ۱- ویژگی‌های دموگرافیک بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان جهت دریافت خدمات

متغیر	گروه‌بندی متغیر	فراوانی	درصد	متغیر	گروه‌بندی متغیر	فراوانی	درصد
درآمد (تومان)	زیر ۲۵۰ هزار	۲	(۰/۷)	سن (سال)	زن	۱۰۵	(۳۷/۴)
	۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار	۶	(۲/۱)		مرد	۱۷۶	(۶۲/۶)
	۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون	۴۷	(۱۶/۷)		۱۴-۲۸	۱۰۳	(۳۶/۷)
	۱ میلیون تا ۲ میلیون	۱۷۹	(۶۳/۷)		۲۹-۴۳	۹۳	(۳۳/۱)
	بیش‌تر از ۲ میلیون	۴۷	(۱۶/۷)		۴۴-۵۸	۳۹	(۱۳/۹)
	بی‌سود	۸	(۲/۸)		۵۹-۷۳	۲۵	(۸/۹)
وضعیت استخدام	ابتدایی	۴۱	(۱۴/۶)	وضعیت استخدام	بالای	۲۱	(۷/۵)
	راهنمایی تا دیپلم	۱۲۱	(۴۳/۱)		کارمند	۴۴	(۱۵/۷)
	فوق دیپلم	۱۱	(۳/۹)		خانه‌دار	۷۱	(۲۵/۳)
	لیسانس	۸۳	(۲۹/۵)		دانشجو	۲۰	(۷/۱)
	فوق لیسانس	۱۴	(۵)		آزاد	۱۰۱	(۳۵/۹)
	دکترا	۳	(۱/۱)		کارگر	۴۵	(۱/۶)

وضعیت تجویز ۶۷/۳٪ با تجویز پژوهش، ۱۱٪ به در خواست بیمار و ۲۱٪ به درخواست هر دو بود. ۷۵/۸٪ از بیمارستان دولتی و ۰/۴٪ از بیمارستان خصوصی بودند و بیش ترین میزان تخصص مربوط به طب اورژانس (۵۵/۵٪) بود. از نظر مناسبت تشخیص ۵۷/۷٪ تشخیص‌ها مناسب، ۳۲/۷٪ نامطمئن و ۹/۶٪ نامناسب بود.

بیش‌ترین میزان شکایت بیماران درد ناجیه کمر ترومای (۸۱/۹٪) و کمترین میزان شکایت مربوط به سرطان (۰/۴٪) و سکولوز (۰/۰٪) بود. از نظر نوع تشخیص بیش‌ترین میزان شکستگی مهره کمر (۴۶/۳٪) و کمترین میزان بیماری‌های عفونی (۰/۴٪) بود. از بین پاسخگویان ۷۴٪ معاینه شده بودند و ۲۶٪ معاینه نشده بودند. از نظر

^۴ Cronbach's alpha

جدول ۲- فراوانی توزیع متغیرهای مختلف در پژوهش

فرافوایی (درصد)	متغیر	فرافوایی (درصد)	متغیر
(۷۴) ۲۰۸	معاینه شده	(۸۱/۹) ۲۳۰	درد ناحیه کمر تروما
(۲۶) ۲۳	معاینه نشده	(۶/۴) ۱۸	درد در ناحیه کمر در ایستادن
(۵۷/۳) ۱۸۹	پزشک	(۲/۵) ۷	ویزیت مجدد
(۱۱) ۳۱	به درخواست بیمار	(۱/۸) ۵	درد شکم و پهلو
(۲۱/۷) ۶۱	به درخواست هردو	(۱/۴) ۴	درد در حالت نشسته
(۷۵/۸) ۲۱۳	بیمارستان دولتی	(۰/۰/۷) ۲	اسیام عضلانی
(۰/۰) ۱	بیمارستان خصوصی	(۰/۰) ۱	سرطان
(۲۳/۸) ۶۷	مطب خصوصی	(۰/۰) ۱	سکولوز
(۲۳/۱) ۶۵	جراح مغز اعصاب	(۴/۶) ۱۳	آسیب به سایر نقاط
(۸/۹) ۲۵	اورتوپد	(۴۶/۳) ۱۳۰	شکستگی مهره کمر
(۴/۳) ۱۲	نورولوژیست	(۱۰/۰/۳) ۴۳	دیسک و جابه جایی مهره کمر
(۷/۸) ۸	روماتولوژیست	(۳/۹) ۱۱	سکولوز
(۵/۳) ۱۵	دیگر تخصصها	(۳/۶) ۱۰	پوکی استخوان
(۵۵/۵) ۱۵۶	طب اورژانس	(۲/۱) ۶	اسپاسم عضلانی
(۵۷/۷) ۱۶۲	مناسب	(۱/۸) ۵	سرطان
(۳۲/۷) ۹۲	نامطمئن	(۰/۰) ۱	بیماری‌های عفونی
(۹/۶) ۲۷	نامناسب	(۲۶/۷) ۷۵	آسیب سایر نقاط بدن

نوع تخصص

وضعیت تجویز

وضعیت موسسه

نوع تخصیص

فرافوایی (درصد)

متغیر

فرافوایی (درصد)

متغیر

نوع شکایت

نوع تشخیص

در سال ۱۳۹۰ نشان داد که ۶۳٪ از تجویزهای سی‌تی اسکن تروماهای خفیف مغزی در بیمارستان‌های تهران ضروری و بقیه غیرضروری بوده‌اند. در مطالعه سالاری و همکاران (۱۴) که در سال ۱۳۸۹ در بیمارستان‌های آموزشی شیراز انجام شد، فقط ۲۰٪ از تجویزهای ام‌آرآی مهره‌های کمری مناسب بودند، حدود ۲۴٪ نامطمئن و حدود ۵۶٪ نامناسب بودند. در مطالعه مذکور نبز از روش مناسب رند استفاده شده بود. در مطالعه مذکور به‌منظور تعیین اندیکاسیون‌های موردنظر از جستجوی شواهد و پنل خبرگان استفاده شده بود.

افزایش هزینه‌های بخش سلامت صرفاً به سطح هزینه‌ها مربوط نمی‌شود؛ بلکه بیشتر مربوط به غیر اثربخش بودن و صرف هزینه‌های بیش از نیاز در این بخش از جامعه می‌باشد. طبق یافته‌های برخی مطالعات انجام شده در جهان به‌طور متوسط یک سوم از تست‌های پزشکی مرسوم و روش درمانی‌های انجام گرفته برای بیماران غیرضروری و یا نامطمئن می‌باشد (۱۵).

به‌طور کلی تجویز روش‌های تصویربرداری پزشکی در ایران بی‌رویه می‌باشد. مطالعات قبلی نیز این ادعا را اثبات می‌کنند. اما نکته قابل توجه این است که در این پژوهش نسبت به مطالعات قبلی درصد تجویزهای نامناسب کمتری رخ داده است. شاید یکی از دلایل این اتفاق ماهیت تروماهی بودن بیمارستان می‌باشد. البته درصد قابل توجهی از تجویزهای در دسته نامطمئن قرار گرفتند. بنابراین با توجه به هزینه قابل توجه دستگاه سی‌تی اسکن این

در این مطالعه همچنین به بررسی ارتباط بین متغیرها با متغیر مناسب پرداخته شد. نتایج آزمون کای اسکور^۵ نشان داد که بین متغیرهای وضعیت معاینه، وضعیت موسسه و نوع تخصص رابطه معنادار آماری وجود دارد. نتایج به این شکل بود که از لحاظ متغیر وضعیت معاینه، بیمارانی که توسط پزشک معاینه نشده بودند و در واقع تجویز سی‌تی اسکن بدون معاینه بیمار صورت گرفته بود، فقط ۲۳٪ تجویزهای مناسب را به خود اختصاص داده بودند (p -value < 0.001). از لحاظ متغیر وضعیت موسسه نیز نتایج حاکی از آن بود که برای بیمارانی که در مطب خصوصی تجویز انجام شده بود، ۲۴٪ تجویزهای مناسب را داشتند (p -value < 0.001). از لحاظ نوع تخصص نیز مشاهده شد که ۵۵٪ تجویزهای صورت گرفته توسط جراحی مغز و اعصاب و ۷۵٪ مربوط به طب اورژانس مناسب بوده‌اند.

بحث

این مطالعه با هدف بررسی مناسبت تجویزهای سی‌تی اسکن مهره‌های کمری در بیمارستان رفراز تروماهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. بدین منظور اندیکاسیون و سپس اقدام به بررسی مناسب تجویزها شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که بیش از نیمی از تجویزهای سی‌تی مهره‌های کمری مقتضی بود و بقیه آنها نامناسب و یا نامطمئن بودند. مطالعه زرگر و همکاران (۱۳)

^۵ Chi square

کاربرد در تصمیم‌های مرتبط با سیاست‌گذاری در نظام سلامت

مطالعه حاضر از دو جنبه می‌تواند در تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران سلامت کمک‌کننده باشد. استفاده از متولوزی فاز اول این مطالعه جهت تدوین راهنمایی بالینی مبتنی بر شواهد در تمامی پروسیجرهای تشخیصی و درمانی نظام سلامت؛ کاربرد دارد. همچنین استفاده از نتایج مربوط به اندیکاسیون‌های تدوین شده برای تجویز سی‌تی اسکن مهره‌های کمری و استفاده از نتایج مربوط به مناسبت تجویز سی‌تی اسکن مهره‌های کمری؛ می‌تواند در نظام سلامت کاربرد داشته باشد.

تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که تأمین مالی طرح حاضر (طرح شماره ۴۷۴۵) را بر عهده گرفتند و از مسئولان بیمارستان شهید چمران به جهت همکاری برای جمع‌آوری داده‌ها تشکر و قدردانی می‌نماییم. (۱۵-۱)

دسته از تجویزها نیز قابل جایگزین با روش‌های معمول پژوهشکی مانند معاینه و گرفتن شرح حال هستند. دستگاه سی‌تی اسکن علاوه بر تحمیل بار مالی، باعث انتقال مقادیر زیادی اشعه ایکس به بیماران می‌شود.

نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج چنین پژوهش‌هایی سیاست‌گذاران سلامت در ایران بایستی از اهرم‌های کنترلی مناسب برای بهینه کردن استفاده از خدمات تشخیصی و درمانی استفاده نمایند. یکی از اهرم‌های کنترلی می‌تواند، پرداخت‌ها باشد. با به کارگیری روش‌های پرداخت مناسب می‌توان درصد مراقبت‌های غیرضروری را به میزان زیادی کاهش داد. اهرم کنترلی می‌تواند رفتار تجویزی پزشکان از یک طرف و تقاضای بیماران را از سوی دیگر به گونه‌ای تنظیم نماید که مراقبت‌های غیرضروری به حداقل برسند. در کنار این موارد می‌توان به اجرایی کردن راهنمایی بالینی به عنوان یک راهکار اساسی اشاره کرد.

References

- 1- Sadeghi A, Keshavarz KH, Ahmadzadeh MS, Yousefi A. Survey of appropriate use of magnetic resonance imaging services provided in shahid chamran hospital of Shiraz. *J Health Res Commun.* 2015;1(3):31-8.
- 2- Bridges JF, Jones C. Patient-based health technology assessment: a vision of the future. *Int J Technol Assess Health Care.* 2007;23(1):30-5.
- 3- Palesh M, Fredrikson S, Jamshidi H, Jonsson PM, Tomson G. Diffusion of magnetic resonance imaging in Iran. *Int J Technol Assess Health Care.* 2007;23(2):278-85.
- 4- Sodickson A, Baeyens PF, Andriole KP, Prevedello LM, Nawfel RD, Hanson R, et al. Recurrent CT, cumulative radiation exposure, and associated radiation-induced cancer risks from CT of adults. *Radiology.* 2009;251(1): 175-84.
- 5- Mitchell JM. Utilization trends for advanced imaging procedures: evidence from individuals with private insurance coverage in California. *Med Care.* 2008;46(5):460-6.
- 6- Lee SI, Saokar A, Dreyer KJ, Weilburg JB, Thrall JH, Hahn PF. Does radiologist recommendation for follow-up with the same imaging modality contribute substantially to high-cost imaging volume? *Radiology.* 2007;242(3): 857-64.
- 7- Hendee WR, Becker GJ, Borgstede JP, Bosma J, Casarella WJ, Erickson BA, et al. Addressing overutilization in medical imaging. *Radiology.* 2010;257(1):240-5.
- 8- Eddy K, Ednie A, Connell C, Eddy R, Eaton K, Mathieson J. Appropriate use of CT and MRI in British Columbia. *BCMJ.* 2013;55(1):22-35.
- 9- Reed MH. Inappropriate Underutilisation of Magnetic Resonance Imaging in British Columbia. *Can Assoc Radiol J.* 2015;66(4):395.
- 10- Sari AA, Nejat S, Mobinizadeh MR, Khabiri R. Estimated of the cost of MRI 3 Tesla MRI 1.5 Tesla in Iran, for the purpose of comparison. *Sci J Kurdistan Univ Med Sci.* 2012;17(1):71-81.
- 11- Crownover BK, Bepko JL. Appropriate and safe use of diagnostic imaging. *Am Fam Physician.* 2013;87(7):494-501.
- 12- M. MP, Aye MR, Mobinizadeh M, Manavi S. Safety and diagnostic performance of dualsource CT scan in comparison with single source CT scan and conventional angiography in coronary heart diseases. *Hospital.* 2010;9(1):25-32.
- 13- Jame SZB, Majdzadeh R, Sari AA, Rashidian A, Arab M, Rahmani H. Indications and overuse of computed tomography in minor head trauma. *Iran Red Crescent Med J.* 2014;16(5):1-6.
- 14- Salari H, Ostovar R, Esfandiari A, Keshtkaran A, Akbari Sari A, Yousefi Manesh H, et al. Evidence for Policy Making: Clinical Appropriateness Study of Lumbar Spine MRI Prescriptions Using RAND Appropriateness Method. *Int J Health Policy Manag.* 2013;1(1):17-21.
- 15- Thom DH, Kravitz RL, Kelly-Reif S, Sprinkle RV, Hopkins JR, Rubenstein LV. A new instrument to measure appropriateness of services in primary care. *Int J Qual Health Care.* 2004;16(2):133-40.

Evaluation of Prescription Appropriateness of CT Scan for Low Back Pain in Shiraz's Referral Trauma Hospital Using RAND Appropriateness Method

Kavosi Zahra (PhD)¹; Esfandiari Atefeh (PhD)²; Frazanegan Gholamreza (MD)³; Abuzar Dehghan (MSc)⁴; Salari Hedayat (PhD)^{2*}

¹ Health Human Resources Research Center, School of Management and Information Sciences,
Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

² PhD in Health Policy, Assistant Professor, Department of Health Policy and Management,
School of Medicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

³ Associate Professor, Department Neurosurgery, Baghiatalla University of Medical Sciences, Tehran, Iran

⁴ MSc Student, Department of Health Services Management, School of Management and
Medical Information, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Abstract

Introduction: This study aims to identify the appropriateness of CT Scan prescriptions for Lumbar Spine using the RAND Appropriateness Method in Shiraz University of Medical Sciences (SUMS).

Methods: A total of 281 patients referred to the hospitals affiliated with Shiraz University of Medical Sciences were selected as sample of the study in 2016. The scenarios derived through the RAND Appropriateness Method were compared with medical records of these patients by educated physicians.

Results: Out of 281 cases of lumbar spine MRI prescriptions, 57.7% were appropriate, 32.7 % were uncertain, and 9.6 % were considered to be appropriate. In addition, some related factors to appropriateness of prescriptions were identified.

Conclusions: Clinical guidelines developed using RAND Appropriateness Method can be an appropriate instrument for policy makers, health care providers, and health insurance companies in order to reduce inappropriate cares and quality improvement, especially in developing countries. It is recommended that appropriateness of prescriptions will be considered as the criteria for payment and reimbursement to prescribers. In this way, inappropriate cares may be reduced.

Keywords: Appropriateness; RAND Appropriateness Method; CT Scan Prescription; Lumbar Spine

Please cite this article as follows:

Kavosi Z, Esfandiari A, Frazanegan Gh R, Abuzar Dehghan, Salari H. Evaluation of Prescription Appropriateness of CT Scan for Low Back Pain in Shiraz's Referral Trauma Hospital Using RAND Appropriateness Method. Hakim Health Sys Res 2018; 20(4): 234- 239.

*Corresponding Author: Bushehr University of Medical Sciences, School of Medicine, Moallem St, Bushehr, Iran. Tel/Fax: +98-7733320657, E-mail: salarihedayat@gmail.com